

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ – SEAD
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ – SESAPI
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PIAUÍ – ESPPI**

**PROCESSO SELETIVO
ESTÁGIO EXTRACURRICULAR – 2026**

**PROVA ESCRITA OBJETIVA
ODONTOLOGIA**

**DATA: 24/05/2026 – HORÁRIO: 08h00 às 11h00
(Horário do Piauí)**

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio depois de transcorrida 1 hora do início da prova.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

NOME DO(A) CANDIDATO(A): _____

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO:

--	--	--	--	--	--



PROVA ODONTOLOGIA

01. Considerando a atuação do cirurgião-dentista frente ao atendimento de pacientes com deficiência intelectual moderada, à luz da teoria principialista e da Lei nº 14.874/2024, analise as assertivas:

I. O princípio da autonomia exige que o profissional considere a capacidade de compreensão do paciente, buscando sua participação no processo decisório mesmo quando houver necessidade de representante legal.

II. A Lei nº 14.874/2024 reforça a necessidade de proteção ética dos participantes vulneráveis em atividades de pesquisa e atendimento em saúde, exigindo avaliação proporcional dos riscos e benefícios envolvidos.

III. O princípio da beneficência autoriza o cirurgião-dentista a omitir informações clínicas ao paciente com deficiência intelectual quando o profissional julgar que a informação poderá gerar ansiedade ou recusa terapêutica.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

2. Em relação aos conflitos éticos no atendimento odontopediátrico, analise as assertivas:

I. O assentimento da criança ou adolescente, quando possível, integra o processo ético de tomada de decisão clínica, ainda que o consentimento formal seja atribuído ao responsável legal.

II. O princípio da justiça relaciona-se à oferta equitativa de cuidado odontológico infantil, incluindo estratégias de acessibilidade para grupos socialmente vulneráveis.

III. A Lei nº 14.874/2024 estabelece que menores de idade podem participar de pesquisas em saúde exclusivamente mediante autorização judicial específica.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas III está correta.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

3. Sobre ética odontológica e proteção de pacientes vulneráveis, analise as assertivas:

I. O sigilo profissional pode sofrer relativização ética e legal em situações que envolvam risco relevante à integridade do paciente ou de terceiros.

II. O princípio da não maleficência implica avaliar se procedimentos invasivos em pacientes especiais produzem benefícios proporcionais aos potenciais danos físicos e emocionais.



III. A Lei nº 14.874/2024 substituiu integralmente a atuação dos Comitês de Ética em Pesquisa por mecanismos institucionais autônomos vinculados às universidades.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas III está correta.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

4. contexto do atendimento odontológico infantil e de pacientes neurodivergentes, analise as assertivas:

I. A utilização de contenção física em odontopediatria demanda justificativa clínica, proporcionalidade e registro adequado em prontuário.

II. O princípio da autonomia exclui a necessidade de diálogo com responsáveis legais quando o paciente pediátrico manifesta desejo de realizar determinado procedimento.

III. A teoria principialista propõe análise integrada entre autonomia, beneficência, não maleficência e justiça na resolução de conflitos éticos em saúde.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Apenas I e III estão corretas.

5. Considerando os fundamentos da bioética aplicados à Odontologia, analise as assertivas:

I. A vulnerabilidade social pode interferir na validade ética do consentimento livre e esclarecido, exigindo cuidados adicionais na comunicação com participantes de pesquisa.

II. A Lei nº 14.874/2024 enfatiza a proteção dos direitos, da dignidade e da segurança dos participantes de pesquisa envolvendo seres humanos.

III. O princípio da justiça bioética restringe-se à distribuição igualitária de recursos financeiros entre instituições públicas e privadas de saúde.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas II está correta.
- E) I, II e III estão corretas.

6. Uma paciente de 42 anos ingressou com ação judicial alegando falha em tratamento reabilitador realizado há três anos. Durante a perícia, o cirurgião-dentista apresentou apenas fotografias clínicas armazenadas em aplicativo de mensagens e receituários impressos sem identificação digital. O prontuário eletrônico utilizado na clínica não continha assinatura eletrônica certificada, registro cronológico das



evoluções clínicas nem termo de consentimento anexado.

À luz da Odontologia Legal, do modelo de prontuário recomendado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e da documentação em saúde, assinale a alternativa correta:

- A) O valor jurídico do prontuário eletrônico depende exclusivamente da existência de backup em nuvem institucional.
- B) O armazenamento de imagens clínicas em aplicativo de mensagens substitui os registros evolutivos quando houver identificação do paciente.
- C) A ausência de assinatura eletrônica qualificada e de registros cronológicos pode comprometer a força probatória do prontuário em demanda judicial.
- D) O prontuário odontológico possui finalidade predominantemente administrativa, sendo secundária sua relevância pericial.
- E) O termo de consentimento livre e esclarecido possui finalidade ética, mas não integra formalmente a documentação odontológica pericial.

7. Um adolescente de 15 anos compareceu ao atendimento odontológico acompanhado da mãe para exodontia de terceiros molares inclusos. Durante a anamnese, relatou uso contínuo de isotretinoína e histórico recente de alterações hematológicas. O cirurgião-dentista realizou o procedimento sem solicitar exames complementares, registrando apenas “paciente apto para cirurgia” no prontuário eletrônico.

Considerando os princípios da Odontologia Legal e a documentação clínica adequada, assinale a alternativa correta:

- A) A anotação resumida da condição sistêmica é suficiente quando houver autorização do responsável legal para o procedimento.
- B) O prontuário eletrônico pode dispensar detalhamento da anamnese desde que o procedimento tenha transcorrido sem intercorrências imediatas.
- C) O registro clínico em odontologia possui prioridade terapêutica, não sendo elemento central em eventual análise pericial.
- D) A solicitação e o registro de exames complementares integram a obrigação documental do profissional diante de condições sistêmicas potencialmente relevantes.
- E) A responsabilidade documental do cirurgião-dentista restringe-se aos procedimentos executados diretamente no consultório.

8. Uma paciente solicitou atestado odontológico após atendimento de urgência por abscesso dentoalveolar. O cirurgião-dentista emitiu documento contendo diagnóstico detalhado, CID, tempo de afastamento e descrição de medicações prescritas, encaminhando-o diretamente ao empregador da paciente por correio eletrônico institucional.

Com base na ética odontológica e nos princípios da Odontologia Legal, assinale a alternativa correta:

- A) O envio direto do atestado ao empregador é compatível com o sigilo profissional quando realizado por canal institucional.
- B) A assinatura digital em atestados eletrônicos possui relevância apenas administrativa, sem repercussão jurídica.
- C) O uso do CID em atestados odontológicos constitui exigência obrigatória em



todas as situações clínicas.

D) O atestado odontológico possui finalidade exclusivamente trabalhista, não integrando os documentos odontolegais.

E) O detalhamento diagnóstico em atestado odontológico depende da anuência do paciente, especialmente quanto à exposição de informações sensíveis.

9. auditoria ética em clínica odontológica, verificou-se que os prontuários eletrônicos continham identificação incompleta dos pacientes, ausência de odontograma inicial e inexistência de registros de intercorrências clínicas ocorridas durante tratamentos restauradores extensos.

À luz das recomendações do Conselho Federal de Odontologia e dos fundamentos periciais da documentação em saúde, assinale a alternativa correta:

A) A inexistência de registros de intercorrências pode comprometer a continuidade do cuidado e a defesa profissional em processos éticos e civis.

B) O odontograma inicial possui relevância predominantemente estética, não sendo elemento essencial para identificação pericial.

C) O modelo de prontuário recomendado pelo CFO prioriza registros financeiros em relação às informações clínicas.

D) O prontuário eletrônico substitui a necessidade de individualização dos registros clínicos quando utilizado em ambiente institucional.

E) A documentação odontológica possui valor pericial apenas em situações de identificação humana pós-morte.

10. Após acidente rodoviário com múltiplas vítimas, um instituto médico-legal utilizou documentação odontológica para identificação humana. Entre os prontuários encaminhados, um deles apresentava radiografias sem identificação nominal, ausência de datas e evolução clínica registrada apenas por códigos internos da clínica.

Considerando os fundamentos da Odontologia Forense e da documentação em saúde, assinale a alternativa correta:

A) Radiografias odontológicas possuem valor identificatório independente da vinculação documental com o paciente.

B) Registros codificados internamente pela clínica substituem adequadamente a identificação civil do paciente em perícias forenses.

C) A padronização e identificação cronológica da documentação odontológica ampliam sua utilidade pericial em processos de identificação humana.

D) O valor forense do prontuário depende prioritariamente da quantidade de exames armazenados em formato digital.

E) A identificação humana por arcada dentária possui aplicabilidade restrita a situações criminais.

11. Considerando os princípios organizacionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a inserção da equipe de saúde bucal no SUS, analise as assertivas:

I. A territorialização e o diagnóstico situacional permitem identificar vulnerabilidades sociais e organizar ações coletivas de promoção e prevenção em saúde bucal.

II. A atuação da equipe de saúde bucal na ESF envolve integração multiprofissional



e acompanhamento longitudinal das famílias adscritas ao território.

III. O modelo assistencial da ESF prioriza predominantemente procedimentos restauradores especializados realizados em nível terciário de atenção.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

12. Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal — Brasil Sorridente — e sua relação com a organização da atenção odontológica no SUS, analise as assertivas:

I. O Brasil Sorridente ampliou a inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família e fortaleceu a integralidade do cuidado em saúde bucal.

II. A política de saúde bucal incorporou os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) como estratégia de referência secundária no SUS.

III. O Brasil Sorridente estruturou a assistência odontológica exclusivamente com foco em ações curativas e reabilitadoras.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III está correta.
- E) Apenas I e II estão corretas.

13. Analise as assertivas a seguir acerca dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e da organização da rede de atenção em saúde bucal:

I. Os CEOs atuam como pontos de atenção secundária articulados à atenção primária por meio de mecanismos de referência e contrarreferência.

II. Entre os serviços mínimos ofertados pelos CEOs estão periodontia especializada, endodontia e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

III. O acesso aos CEOs ocorre prioritariamente por demanda espontânea da população, sem necessidade de articulação com a atenção básica.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

14. Com base nos fundamentos da Odontologia em Saúde Coletiva descritos por Antonio Carlos Pereira, analise as assertivas:

I. O planejamento em saúde bucal coletiva depende da análise epidemiológica e dos determinantes sociais de saúde presentes no território.

II. Indicadores epidemiológicos, como CPO-D e índice periodontal comunitário, podem subsidiar prioridades assistenciais e estratégias preventivas.



III. O modelo de atenção em saúde coletiva reduz a participação social no planejamento das ações odontológicas, priorizando decisões técnico-administrativas centralizadas.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

15. Sobre a integralidade do cuidado em saúde bucal no contexto da atenção primária e da saúde da família, analise as assertivas:

I. A integralidade pressupõe articulação entre ações clínicas individuais, atividades coletivas e práticas intersetoriais de promoção da saúde.

II. O trabalho da equipe de saúde bucal na atenção primária inclui educação em saúde, visitas domiciliares e ações compartilhadas com outros profissionais da ESF.

III. A lógica assistencial da saúde coletiva estabelece separação funcional rígida entre atenção básica e atenção especializada, reduzindo a necessidade de comunicação entre os níveis de atenção.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

16. Uma paciente de 34 anos procurou uma Unidade Básica de Saúde relatando dor persistente no elemento 26, exacerbada à mastigação. O cirurgião-dentista solicitou radiografia periapical, observando imagem radiolúcida circunscrita na região periapical associada a perda da lâmina dura e discreto espessamento do espaço periodontal.

Considerando os princípios de interpretação radiográfica e a aplicação das técnicas radiológicas no serviço público odontológico, assinale a alternativa correta:

- A) A radiografia panorâmica seria o exame inicial mais indicado para avaliar detalhadamente alterações periapicais localizadas.
- B) A radiografia interproximal apresenta maior sensibilidade para avaliação de lesões periapicais posteriores extensas.
- C) A perda da lâmina dura indica prioritariamente alteração anatômica fisiológica relacionada à idade da paciente.
- D) O espaço periodontal aumentado possui relevância diagnóstica apenas quando associado a fratura radicular evidente.
- E) A imagem descrita sugere processo inflamatório periapical compatível com comprometimento pulpar e periodontal apical.

17. Durante atendimento em um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), uma gestante no segundo trimestre necessitou de exame radiográfico para avaliação



endodôntica. O profissional optou pela realização de radiografia periapical digital utilizando avental plumbífero, colar cervical e técnica do paralelismo.

À luz dos princípios de radioproteção e das diretrizes de biossegurança em saúde pública, assinale a alternativa correta:

- A) O uso da técnica do paralelismo contribui para redução de repetições radiográficas e melhora da padronização da imagem obtida.
- B) A gestação contraindica exames radiográficos odontológicos, independentemente da justificativa clínica apresentada.
- C) O colar cervical apresenta relevância limitada em exames intraorais digitais devido à menor dose de radiação emitida.
- D) A radiografia digital possui aplicabilidade prioritariamente administrativa no SUS, com impacto secundário no diagnóstico clínico.
- E) O princípio da radioproteção fundamenta-se principalmente na substituição de exames intraorais por tomografia computadorizada.

18. Em ação de triagem odontológica vinculada ao programa Brasil Sorridente, um paciente de 17 anos apresentou retenção prolongada do elemento 53 e ausência clínica do canino permanente superior direito. Foi solicitada radiografia panorâmica no serviço de referência municipal.

Considerando a interpretação da imagem e o papel da imaginologia no SUS, assinale a alternativa correta:

- A) A investigação de caninos impactados requer exclusivamente tomografia computadorizada como exame inicial no serviço público odontológico.
- B) A radiografia panorâmica permite avaliação global das arcadas e estruturas adjacentes, sendo útil em casos de alterações eruptivas e dentes impactados.
- C) A ausência clínica de canino permanente em adolescentes possui relação prioritária com alterações periodontais inflamatórias.
- D) A radiografia panorâmica apresenta finalidade predominantemente documental, com limitação diagnóstica para alterações ósseas e dentárias.
- E) O exame interproximal seria mais indicado para localização espacial inicial de dentes inclusos em região anterior.

19. Uma Unidade de Saúde da Família implantou integração entre radiografia digital e o e-SUS APS PEC para armazenamento de exames de imagem odontológicos. Durante auditoria interna, observou-se ausência de identificação adequada em parte dos arquivos radiográficos anexados aos prontuários.

Considerando os princípios éticos, legais e diagnósticos da imaginologia odontológica, assinale a alternativa correta:

- A) O armazenamento digital elimina a necessidade de identificação nominal dos exames radiográficos anexados ao prontuário eletrônico.
- B) O registro radiográfico eletrônico possui relevância restrita ao acompanhamento administrativo da unidade de saúde.
- C) A integração entre radiologia digital e prontuário eletrônico favorece rastreabilidade clínica, continuidade do cuidado e organização documental.
- D) Imagens radiográficas digitais dispensam descrição clínica quando anexadas ao prontuário eletrônico institucional.



E) A utilização do prontuário eletrônico substitui protocolos de proteção radiológica adotados durante aquisição das imagens.

20. Durante atividade preventiva em escola vinculada à atenção primária, um cirurgião-dentista identificou, por meio de radiografias interproximais, lesões cariosas iniciais em superfícies proximais de molares permanentes sem cavitação clínica evidente.

Com base nos princípios de promoção de saúde bucal e interpretação radiográfica, assinale a alternativa correta:

- A) O rastreamento radiográfico em escolares possui finalidade predominantemente epidemiológica, sem impacto terapêutico individual.
- B) Radiografias interproximais possuem indicação prioritária para avaliação de lesões periapicais extensas em dentes posteriores.
- C) A presença de radiolucidez proximal inicial determina necessidade imediata de tratamento restaurador invasivo em todos os casos.
- D) A interpretação radiográfica da cárie possui relevância secundária quando comparada ao exame clínico visual em saúde coletiva.
- E) Lesões proximais detectadas radiograficamente em estágio inicial podem subsidiar estratégias preventivas e controle não invasivo da doença cárie.

21. Considerando as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para biossegurança em serviços odontológicos hospitalares, analise as assertivas:

I. A sequência adequada de retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) busca reduzir risco de autoinoculação e contaminação cruzada durante o desparamento.

II. O uso de máscara cirúrgica associada à proteção ocular integra as precauções padrão em procedimentos odontológicos com potencial geração de respingos biológicos.

III. A higienização das mãos pode ser substituída pelo uso contínuo de luvas durante atendimentos consecutivos em ambiente hospitalar, desde que não haja rompimento do material.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

22. Sobre o processamento de instrumentais odontológicos utilizados em ambiente hospitalar, analise as assertivas:

I. O monitoramento biológico da autoclave constitui importante mecanismo de controle da eficácia do processo de esterilização.

II. A limpeza prévia dos instrumentais interfere diretamente na efetividade da esterilização por vapor saturado sob pressão.

III. Instrumentais classificados como críticos podem retornar ao uso clínico após desinfecção de alto nível quando acondicionados em embalagem estéril.



Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III está correta.
- E) I, II e III estão corretas.

23. No contexto do atendimento odontológico hospitalar e ambulatorial, analise as assertivas:

- I. Procedimentos geradores de aerossóis demandam medidas adicionais de proteção respiratória e controle ambiental conforme avaliação de risco biológico.
- II. O uso de sucção de alta potência contribui para redução da dispersão de partículas contaminantes durante procedimentos clínicos.
- III. A ventilação do ambiente clínico possui impacto secundário na prevenção de infecções relacionadas à assistência em saúde odontológica.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

24. Com base nas RDCs da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, analise as assertivas:

- I. Materiais perfurocortantes utilizados em procedimentos odontológicos devem ser descartados em recipientes rígidos, resistentes à punctura e identificados adequadamente.
- II. O gerenciamento adequado dos resíduos integra as estratégias de controle de infecção e proteção ocupacional em serviços odontológicos.
- III. Resíduos biológicos provenientes de atendimento odontológico hospitalar podem ser descartados juntamente com resíduos comuns quando submetidos previamente à limpeza química.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas III está correta.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

25. Sobre medidas de biossegurança no atendimento odontológico a pacientes hospitalizados, analise as assertivas:

- I. Pacientes submetidos a precauções por transmissão aérea podem demandar adaptações específicas de EPIs conforme protocolos institucionais e avaliação clínica.
- II. A paramentação adequada do profissional contribui simultaneamente para proteção ocupacional e segurança do paciente assistido.



III. As normas de biossegurança em odontologia hospitalar restringem-se ao ambiente cirúrgico, possuindo aplicabilidade limitada em enfermarias e UTIs.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) I, II e III estão corretas.

26. Um homem de 58 anos, tabagista e etilista crônico, procurou atendimento em uma Unidade Básica de Saúde relatando “ferida na língua” há aproximadamente três meses, associada a discreta dor e dificuldade mastigatória. Ao exame clínico, observou-se úlcera infiltrativa de bordas endurecidas em borda lateral de língua, com áreas eritroleucoplásicas adjacentes e linfonodo submandibular palpável, móvel e endurecido.

Considerando o diagnóstico diferencial das doenças bucais, assinale a alternativa correta:

- A) O quadro clínico sugere processo traumático crônico relacionado predominantemente ao contato dentário.
- B) A mobilidade linfonodal afasta possibilidade de disseminação neoplásica regional.
- C) A presença de áreas eritroleucoplásicas e endurecimento periférico aumenta a suspeita clínica de carcinoma espinocelular
- D) Lesões ulceradas dolorosas em língua apresentam maior associação com infecções fúngicas superficiais.
- E) O acompanhamento clínico sem biópsia inicial constitui conduta prioritária diante da estabilidade sistêmica do paciente.

27. Uma paciente de 29 anos compareceu ao serviço odontológico relatando múltiplas placas esbranquiçadas na mucosa oral associadas a sensação de ardência. Durante a anamnese, informou histórico recente de relação sexual desprotegida. Ao exame clínico, observaram-se placas brancas removíveis à raspagem, áreas eritematosas subjacentes e linfadenopatia cervical discreta.

Com base no diagnóstico diferencial das doenças bucais e nas manifestações de infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa correta:

- A) O quadro clínico descrito é compatível exclusivamente com leucoplasia homogênea associada ao tabagismo.
- B) A avaliação odontológica apresenta papel secundário na identificação de manifestações bucais associadas às ISTs.
- C) A presença de ardência oral reduz a possibilidade diagnóstica de infecções oportunistas associadas ao HIV.
- D) Linfadenopatia cervical em pacientes jovens possui relação prioritária com alterações odontogênicas agudas.
- E) Lesões removíveis à raspagem associadas a imunossupressão podem sugerir candidose oral relacionada a comprometimento sistêmico.



28. Durante campanha de prevenção ao câncer bucal no serviço público, um paciente de 46 anos apresentou lesão pigmentada irregular em palato duro, assintomática e de crescimento progressivo. O exame revelou assimetria, variação de tonalidade e bordas pouco definidas.

Considerando os critérios clínicos de diagnóstico diferencial em patologia bucal, assinale a alternativa correta:

- A) Lesões pigmentadas assintomáticas em palato duro apresentam comportamento clínico predominantemente inflamatório.
- B) A presença de assimetria e variação cromática pode indicar necessidade de investigação para melanoma oral.
- C) O crescimento lento da lesão reduz significativamente a relevância diagnóstica de neoplasias malignas pigmentadas.
- D) Lesões melanóticas bucais possuem associação prioritária com alterações traumáticas de mucosa palatina.
- E) A ausência de ulceração exclui possibilidade de malignidade em lesões pigmentadas orais.

29. Um homem de 37 anos procurou atendimento odontológico devido ao aparecimento de úlcera indolor em lábio inferior há cerca de duas semanas. Relatou aumento de linfonodos cervicais e histórico de exposição sexual recente sem proteção. Ao exame clínico, observou-se úlcera única, endurecida e de fundo limpo. À luz do diagnóstico diferencial das doenças bucais e das ISTs, assinale a alternativa correta:

- A) Linfadenopatia cervical em sífilis primária ocorre predominantemente em estágios avançados da doença.
- B) Lesões ulceradas indolores em lábio inferior apresentam maior associação com herpes simples recorrente.
- C) O endurecimento periférico da lesão reduz a possibilidade de etiologia infecciosa sistêmica.
- D) O aspecto clínico é compatível com cancro duro associado à sífilis primária.
- E) A ausência de dor indica baixa transmissibilidade da lesão durante o contato direto.

30. Uma paciente de 61 anos, usuária de prótese total superior e fumante há mais de 30 anos, apresentou placa branca não removível em assoalho bucal identificada durante consulta de rotina na atenção primária. A lesão apresentava áreas rugosas e pontos eritematosos focais.

Considerando o diagnóstico diferencial das doenças bucais, assinale a alternativa correta:

- A) Lesões brancas não removíveis em assoalho bucal apresentam baixo potencial de transformação maligna.
- B) A associação entre tabagismo, áreas eritroleucoplásicas e localização em assoalho bucal aumenta a relevância clínica da lesão.
- C) O uso prolongado de prótese total constitui fator suficiente para definição diagnóstica de hiperplasia traumática.
- D) Lesões potencialmente malignas em mucosa oral possuem comportamento



clínico invariável independentemente da localização anatômica.

E) A presença de áreas rugosas sugere predominantemente alteração infecciosa superficial de mucosa.

31. ma paciente de 22 anos, sem comorbidades conhecidas, apresentou sudorese fria, palidez cutânea, tontura e redução transitória do nível de consciência durante anestesia local para exodontia de terceiro molar inferior. O cirurgião-dentista observou pulso bradicárdico e respiração preservada.

Considerando o manejo das urgências médicas em Odontologia, assinale a alternativa correta:

A) O quadro clínico sugere crise hipertensiva aguda, sendo indicada posição de Trendelenburg reversa e estímulo à deambulação precoce.

B) O uso profilático de antibióticos reduz recorrência de episódios neurocardiogênicos em ambiente odontológico.

C) A administração imediata de glicose intravenosa constitui primeira escolha terapêutica diante da redução transitória da consciência.

D) A principal conduta inicial consiste em posicionar a paciente em decúbito supino com elevação dos membros inferiores e monitorar sinais vitais.

E) A manutenção da paciente em posição sentada favorece estabilização hemodinâmica e recuperação autonômica.

32. Um paciente de 47 anos com histórico de troca valvar cardíaca procurou atendimento em um Centro de Especialidades Odontológicas para raspagem subgengival extensa devido à periodontite avançada. O cirurgião-dentista avaliou necessidade de profilaxia antibiótica antes do procedimento.

À luz das recomendações atuais relacionadas à endocardite infecciosa, assinale a alternativa correta:

A) Procedimentos periodontais invasivos podem demandar profilaxia antibiótica em pacientes com determinadas cardiopatias de alto risco.

B) A profilaxia antibiótica possui indicação prioritária em procedimentos restauradores sem manipulação gengival.

C) Pacientes com prótese valvar apresentam risco reduzido para endocardite infecciosa associada a bacteremia odontogênica.

D) A avaliação do risco de endocardite infecciosa depende predominantemente da duração do procedimento clínico realizado.

E) O uso profilático de antimicrobianos possui finalidade principal de controle da dor pós-operatória em procedimentos periodontais.

33. Um homem de 35 anos compareceu à Unidade de Pronto Atendimento com edema facial difuso em região submandibular direita, febre, trismo moderado e dor intensa associada ao elemento 48 parcialmente erupcionado. O exame revelou elevação de assoalho bucal e dificuldade discreta para deglutição.

Considerando o manejo das urgências odontológicas infecciosas, assinale a alternativa correta:

A) A drenagem cirúrgica possui indicação secundária em infecções associadas a terceiros molares inferiores.



- B) A ausência de comprometimento respiratório elimina a necessidade de monitoramento hospitalar da infecção.
- C) O tratamento prioritário consiste exclusivamente em analgesia e reavaliação ambulatorial após regressão espontânea do edema.
- D) O trismo observado apresenta relação predominante com disfunção temporomandibular crônica preexistente.
- E) O quadro clínico sugere infecção odontogênica com potencial disseminação para espaços fasciais cervicais profundos.

34. Durante procedimento restaurador sob anestesia local, uma paciente apresentou prurido difuso, edema labial e dificuldade respiratória leve poucos minutos após administração medicamentosa. O profissional interrompeu o atendimento e iniciou medidas emergenciais.

Considerando o manejo inicial das reações alérgicas em ambiente odontológico, assinale a alternativa correta:

- A) A manutenção do procedimento odontológico auxilia na estabilização emocional e redução dos sintomas sistêmicos.
- B) O edema labial isolado reduz significativamente a possibilidade de progressão sistêmica do quadro alérgico.
- C) A avaliação das vias aéreas e monitoramento respiratório constituem medidas prioritárias diante da suspeita de reação anafilática.
- D) Reações de hipersensibilidade relacionadas a anestésicos locais apresentam etiologia predominantemente infecciosa.
- E) O posicionamento em decúbito dorsal horizontal sem monitoramento respiratório constitui medida suficiente na maioria dos casos.

35. Um paciente diabético de 63 anos compareceu ao atendimento odontológico em jejum prolongado para realização de múltiplas exodontias. Durante o procedimento, apresentou tremores, sudorese intensa, taquicardia e alteração do comportamento. Considerando as emergências médicas em Odontologia, assinale a alternativa correta:

- A) A monitorização glicêmica possui relevância limitada em procedimentos odontológicos ambulatoriais extensos.
- B) Tremores e sudorese durante atendimento odontológico estão relacionados prioritariamente à ansiedade antecipatória.
- C) A continuidade do procedimento reduz liberação adrenérgica e favorece estabilização metabólica do paciente.
- D) Pacientes diabéticos em jejum prolongado apresentam menor suscetibilidade a alterações glicêmicas durante procedimentos invasivos.
- E) O quadro clínico é sugestivo de hipoglicemia, exigindo interrupção do atendimento e correção imediata da glicemia.

36. Um paciente de 68 anos, portador de fibrilação atrial crônica e em uso contínuo de varfarina, foi encaminhado ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial para exodontia do elemento 36 com extensa destruição coronária e episódios recorrentes de infecção odontogênica. O INR aferido 24 horas antes do



procedimento foi de 2,8.

Considerando o manejo cirúrgico de pacientes sistemicamente comprometidos, assinale a alternativa correta:

- A) O valor de INR apresentado contraindica qualquer procedimento cirúrgico odontológico ambulatorial.
- B) A decisão clínica deve considerar controle local de hemostasia associado à avaliação individualizada do risco tromboembólico e hemorrágico.
- C) A suspensão imediata da anticoagulação por tempo indeterminado representa a principal estratégia preventiva para hemorragias pós-operatórias.
- D) O risco infeccioso odontogênico possui impacto secundário na tomada de decisão cirúrgica em pacientes anticoagulados.
- E) Procedimentos exodônticos em pacientes anticoagulados demandam obrigatoriamente internação hospitalar em unidade intensiva.

37. Uma paciente de 54 anos em tratamento quimioterápico para carcinoma mamário apresentou dor intensa no elemento 11, edema vestibular e fístula ativa. O hemograma revelou neutropenia moderada. A equipe hospitalar solicitou avaliação odontológica imediata.

À luz da atuação odontológica hospitalar e da Endodontia em pacientes sistemicamente comprometidos, assinale a alternativa correta:

- A) O edema vestibular associado à fístula indica processo infeccioso crônico sem repercussão sistêmica relevante.
- B) A presença de neutropenia reduz a relevância clínica de focos infecciosos odontológicos localizados.
- C) Procedimentos endodônticos em pacientes oncológicos possuem finalidade predominantemente paliativa, com impacto reduzido no prognóstico sistêmico.
- D) Infecções odontogênicas em pacientes imunossuprimidos podem apresentar rápida disseminação sistêmica e demandam manejo integrado multiprofissional.
- E) O atendimento odontológico hospitalar prioriza exclusivamente intervenções cirúrgicas extensas em pacientes imunocomprometidos.

38. Um paciente de 72 anos encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob ventilação mecânica há oito dias após acidente vascular cerebral isquêmico extenso. Durante avaliação multiprofissional, observaram-se biofilme espesso, saburra lingual intensa e sangramento gengival ao toque.

Considerando a atuação do cirurgião-dentista em ambiente intensivo, assinale a alternativa correta:

- A) O controle do biofilme oral em pacientes intubados pode contribuir para redução do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica.
- B) Alterações bucais em pacientes críticos possuem impacto predominantemente estético e baixa repercussão clínica sistêmica.
- C) A higiene bucal em UTI apresenta indicação prioritária apenas em pacientes conscientes e colaborativos.
- D) Sangramento gengival em pacientes críticos possui relação predominante com trauma mecânico decorrente da intubação orotraqueal.
- E) A atuação odontológica em terapia intensiva restringe-se ao manejo de



traumatismos faciais graves.

39. Um homem de 59 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2 com controle glicêmico irregular, necessitou de remoção cirúrgica de remanescente radicular associado a lesão periapical extensa. Durante a avaliação pré-operatória, apresentou glicemia capilar de 298 mg/dL e relato de cicatrização lenta em procedimentos anteriores.

Considerando os princípios cirúrgicos em pacientes sistemicamente comprometidos, assinale a alternativa correta:

- A) A realização imediata do procedimento cirúrgico reduz risco metabólico relacionado à hiperglicemia persistente.
- B) Lesões periapicais crônicas em pacientes diabéticos apresentam comportamento clínico exclusivamente localizado.
- C) O descontrole glicêmico pode interferir na resposta imunológica e no processo cicatricial pós-operatório.
- D) A cicatrização pós-operatória em pacientes diabéticos depende prioritariamente da extensão anatômica da cirurgia realizada.
- E) O controle infeccioso odontológico possui relevância secundária diante das alterações metabólicas sistêmicas.

40. Uma paciente de 67 anos em uso prolongado de bisfosfonato intravenoso para tratamento de metástases ósseas procurou atendimento devido à mobilidade dentária e exposição óssea em região posterior mandibular após exodontia realizada há dois meses.

Com base nos conhecimentos de cirurgia bucomaxilofacial e atendimento ao paciente sistêmico, assinale a alternativa correta:

- A) A osteonecrose medicamentosa possui associação clínica prioritária com infecções virais oportunistas da mucosa oral.
- B) A mobilidade dentária pós-exodontia indica prioritariamente falha mecânica na sutura realizada.
- C) O uso de bisfosfonatos apresenta repercussão predominantemente periodontal, com baixa influência no metabolismo ósseo maxilar.
- D) A exposição óssea persistente em pacientes usuários de bisfosfonatos pode sugerir osteonecrose medicamentosa dos maxilares.
- E) O manejo odontológico de pacientes em terapia antirreabsortiva restringe-se ao acompanhamento radiográfico periódico.

41. Uma criança de 9 anos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi encaminhada para atendimento odontológico devido à presença de múltiplas lesões cáries e dificuldade de higiene bucal. Durante a consulta, a mãe relatou hipersensibilidade sonora, uso contínuo de risperidona e episódios prévios de agitação em atendimentos médicos.

Considerando a abordagem odontológica do paciente com necessidades especiais, assinale a alternativa correta:

- A) A anamnese deve incluir aspectos comportamentais, uso de medicamentos e fatores desencadeantes de ansiedade para planejamento individualizado do



atendimento.

- B) O uso de antipsicóticos possui relevância predominantemente psiquiátrica, com baixa interferência na conduta odontológica.
- C) Pacientes com TEA apresentam indicação prioritária para atendimento hospitalar independentemente da complexidade clínica.
- D) A abordagem clínica deve priorizar procedimentos invasivos em sessão única para reduzir número de consultas.
- E) A dificuldade de comunicação reduz a importância do condicionamento comportamental durante o atendimento odontológico.

42. Um adolescente de 14 anos com epilepsia controlada por carbamazepina necessitou de exodontia do elemento 75 em ambiente ambulatorial. Durante a anamnese, a responsável informou histórico de xerostomia e hiperplasia gengival discreta.

À luz da terapêutica medicamentosa em Odontologia, assinale a alternativa correta:

- A) A hiperplasia gengival associada a anticonvulsivantes possui relação prioritária com deficiência nutricional.
- B) A presença de epilepsia contraindica procedimentos odontológicos ambulatoriais eletivos.
- C) Medicamentos anticonvulsivantes podem influenciar condições bucais e devem ser considerados no planejamento odontológico.
- D) Pacientes epiléticos apresentam risco reduzido de interações medicamentosas durante terapêutica odontológica.
- E) A xerostomia relatada possui impacto secundário na atividade de cárie e saúde periodontal.

43. Uma paciente de 26 anos com deficiência intelectual severa e cardiopatia congênita necessitava de múltiplas exodontias devido a focos infecciosos crônicos. Após tentativas frustradas de atendimento ambulatorial por limitação de colaboração, a equipe avaliou necessidade de intervenção hospitalar. Considerando os princípios do atendimento odontológico ao PNE, assinale a alternativa correta:

- A) O atendimento hospitalar reduz a necessidade de integração multiprofissional no cuidado do paciente especial.
- B) A dificuldade de colaboração constitui fator exclusivamente psicológico, sem repercussão sobre o planejamento anestésico.
- C) Procedimentos odontológicos hospitalares possuem indicação prioritária apenas em situações de emergência infecciosa aguda.
- D) A cardiopatia congênita apresenta impacto secundário na definição do ambiente terapêutico odontológico.
- E) O ambiente hospitalar pode ser indicado quando a complexidade sistêmica e comportamental compromete a segurança do atendimento ambulatorial.

44. Uma criança de 8 anos com síndrome de Down compareceu à Unidade Básica de Saúde para consulta preventiva. O exame clínico revelou macroglossia relativa, má higiene bucal e gengivite generalizada. A mãe relatou dificuldade motora durante



escovação domiciliar.

Considerando a atenção odontológica ao paciente com necessidades especiais, assinale a alternativa correta:

- A) A gengivite em pacientes com síndrome de Down apresenta etiologia predominantemente medicamentosa.
- B) A orientação ao cuidador e o acompanhamento preventivo periódico são importantes para controle periodontal e promoção de saúde bucal.
- C) Alterações motoras possuem influência limitada na efetividade da higiene oral domiciliar.
- D) A macroglossia relativa contraindica uso de escovas convencionais adaptadas em ambiente domiciliar.
- E) O atendimento preventivo em pacientes com síndrome de Down possui prioridade secundária diante das alterações sistêmicas associadas.

45. Um paciente de 63 anos com doença de Parkinson em uso de levodopa e antidepressivo tricíclico procurou atendimento odontológico para tratamento endodôntico devido à dor espontânea intensa no elemento 46. O cirurgião-dentista avaliou necessidade de analgesia e anestesia local.

Com base na terapêutica medicamentosa em pacientes com necessidades especiais, assinale a alternativa correta:

- A) A prescrição odontológica em pacientes idosos depende principalmente da intensidade da dor relatada.
- B) Medicamentos utilizados em doenças neurológicas possuem baixa influência sobre prescrições analgésicas odontológicas.
- C) O tratamento endodôntico em pacientes com Parkinson demanda prioritariamente ambiente hospitalar.
- D) A doença de Parkinson interfere predominantemente em funções cognitivas, com menor impacto motor durante atendimento clínico.
- E) A avaliação das medicações em uso é necessária devido ao potencial de interações farmacológicas relevantes na prática odontológica.

46. Uma paciente de 24 anos procurou a Unidade Básica de Saúde relatando insatisfação estética após fratura parcial do ângulo incisal do elemento 11 durante prática esportiva. Ao exame clínico, observou-se pequena perda de estrutura dentária sem exposição pulpar.

Considerando as abordagens estéticas mais utilizadas na atenção primária, assinale a alternativa correta:

- A) O clareamento dental isolado corrige adequadamente perdas estruturais em borda incisal.
- B) A exodontia seguida de prótese provisória constitui primeira escolha em fraturas coronárias limitadas ao esmalte e dentina.
- C) A restauração direta com resina composta representa alternativa conservadora e amplamente utilizada para reconstruções anteriores.
- D) O tratamento restaurador direto possui finalidade predominantemente funcional, com baixa relevância estética.
- E) A reconstrução coronária anterior exige obrigatoriamente tratamento hospitalar



especializado.

47. Uma paciente de 32 anos solicitou fechamento de diastema entre os incisivos centrais superiores por motivos estéticos. Após avaliação clínica, o cirurgião-dentista explicou limitações técnicas e possibilidades terapêuticas antes do procedimento restaurador.

À luz da Bioética Clínica e do Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa correta:

- A) O esclarecimento sobre riscos, limitações e alternativas terapêuticas integra a conduta ética do atendimento odontológico estético.
- B) Procedimentos estéticos dispensam documentação clínica detalhada quando realizados em atenção básica.
- C) O desejo estético do paciente substitui a necessidade de avaliação funcional e oclusal.
- D) O registro fotográfico possui finalidade prioritariamente publicitária em Odontologia estética.
- E) Procedimentos restauradores anteriores apresentam impacto predominantemente cosmético, sem repercussão psicossocial.

48. Um adolescente de 15 anos compareceu ao serviço odontológico após traumatismo em bicicleta, apresentando fratura coronária limitada ao esmalte e dentina no elemento 21. O teste de sensibilidade pulpar apresentou resposta positiva.

Considerando as técnicas restauradoras estéticas mais utilizadas, assinale a alternativa correta:

- A) Fraturas coronárias em incisivos centrais apresentam repercussão estética limitada em adolescentes.
- B) A ausência de exposição pulpar indica necessidade prioritária de tratamento endodôntico imediato.
- C) A restauração provisória em ionômero de vidro constitui solução definitiva para demandas estéticas anteriores extensas.
- D) A reconstrução direta com resina composta permite recuperação estética e funcional em sessão clínica ambulatorial.
- E) O uso de resinas compostas possui indicação prioritária para dentes posteriores extensamente destruídos.

49. Uma usuária da Estratégia Saúde da Família relatou desconforto social devido à presença de restaurações antigas escurecidas nos incisivos superiores. Durante o planejamento terapêutico, o cirurgião-dentista propôs substituição restauradora com resina composta.

Sobre o atendimento odontológico estético na atenção primária, assinale a alternativa correta:

- A) A Odontologia estética na atenção básica possui finalidade predominantemente cosmética e desvinculada da saúde integral.
- B) Procedimentos restauradores estéticos podem contribuir para autoestima, convívio social e qualidade de vida dos pacientes.
- C) A substituição de restaurações anteriores depende prioritariamente da idade



cronológica do paciente.

D) O atendimento restaurador estético em unidades públicas restringe-se a situações traumáticas agudas.

E) Restaurações estéticas anteriores apresentam relevância secundária no planejamento odontológico integral.

50. Uma paciente de 40 anos buscou atendimento odontológico devido a alterações de forma e pequenas manchas em incisivos laterais superiores. Após avaliação clínica, o profissional considerou uso de facetas diretas em resina composta.

Considerando o planejamento estético restaurador, assinale a alternativa correta:

A) O sucesso estético das facetas depende exclusivamente do polimento final da restauração.

B) O planejamento restaurador estético depende prioritariamente da preferência cromática do profissional.

C) Alterações discretas de forma dental contraindicam procedimentos restauradores minimamente invasivos.

D) O uso de resina composta em facetas diretas possui aplicabilidade restrita ao ambiente hospitalar.

E) Facetas diretas em resina composta representam alternativa conservadora para correção estética de forma e cor dental.

